

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**



TESIS:

**CARACTERÍSTICAS CLINICO-EPIDEMIOLÓGICAS Y MANEJO DEL
ABORTO EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO: ABRIL- JUNIO
2016**

TESIS PRESENTADO POR:

BACH. AIQUIPA DURAND YOSELIT MIGUEL

ASESOR:

DR. JUAN JOSÉ PALOMINO DELGADO

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO
CUSCO – PERU

2016

RESUMEN

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS Y MANEJO DEL ABORTO, HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO: ABRIL-JUNIO DE 2016

OBJETIVO GENERAL: Determinar las características clínico-epidemiológicas y manejo del aborto en el Hospital Regional del Cusco durante abril a junio del 2016.

MATERIALES Y MÉTODOS: Tipo de estudio no experimental, prospectivo, transversal y descriptivo. La población de estudio abarco a 130 pacientes que ingresaron con el diagnóstico de aborto al servicio de ginecología del Hospital Regional del Cusco desde el 15 de abril al 15 de junio del 2016, pero la muestra final estuvo representada por 127 pacientes quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La información se obtuvo mediante la entrevista personal y la revisión de la historia clínica de la paciente, para llenar completamente la ficha de recolección de datos.

RESULTADOS: La forma de hospitalización más frecuente de las pacientes con diagnóstico de aborto fue por el servicio de emergencia con el 98.4%, además el 48% de pacientes llegaron referidas de centros de salud de menor complejidad. La edad promedio a la que se presentó el mayor número de abortos fue 29.80 años. El 50.4% de las pacientes procedían del área urbana. El 74.8% tuvieron la condición de ser convivientes. La ocupación más frecuente con el 59.1% fue la de ser amas de casa. El grado de instrucción predominante fue el de secundaria con el 42.5%. El 71.7% de las gestaciones no fueron planificadas y un 75% de las pacientes tienen algún grado de conocimiento sobre el aborto. La edad gestacional promedio a la que se presentó el aborto fue 9.94 semanas. Fueron primigestas un 26.0%. Un 21.3% de las pacientes ya habían presentado por lo menos un aborto previo. El 70% de las pacientes no utilizaron ningún método anticonceptivo. El tipo de aborto más frecuente con el 75.6% fue el aborto incompleto. El 51.2% de las pacientes presentaron anemia y el 21.3% de las pacientes presentaron alguna complicación del aborto. El legrado uterino instrumental fue el procedimiento de mayor elección con el 96.9%. El 95.5% de las pacientes recibió terapia antibiótica, siendo de elección como profilaxis la doxiciclina con el 42.6% y el cloranfenicol en un 25.5%. Al momento del alta, el 72.4% de pacientes aceptaron utilizar un método anticonceptivo postaborto siendo de elección el inyectable con el 50.4%.

CONCLUSIONES: La forma de hospitalización más frecuente de las pacientes con diagnóstico de aborto fue por el servicio de emergencia. La edad promedio a la que se presentó el mayor número de abortos fue 29.80 años; la mayoría de pacientes procedieron del área urbana; la mayoría de pacientes tuvieron la condición de ser convivientes; la ocupación más frecuente fue la de ser amas de casa; el grado de instrucción predominante fue el de secundaria; más de la mitad de las gestaciones no fueron planificadas. Más de la mitad de las pacientes no utilizaron ningún método anticonceptivo; el aborto incompleto es el tipo de aborto que se presentó con mayor frecuencia. El legrado uterino instrumental fue el procedimiento de mayor elección. La elección como profilaxis antibiótica fue la doxiciclina.

PALABRAS CLAVE: aborto, incidencia, características clínico-epidemiológicas.